

# **ALLIUM SATIVUM ДЛЯ ГОМЕОПАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ**

## **Allium sativum ad praeparationes homoeopathicas**

### **ALLIUM SATIVUM FOR HOMOEOPATHIC PREPARATIONS**

Свіжі цибулини *Allium sativum* L.

#### **ВЛАСТИВОСТИ**

Після розрізання має характерний запах.

#### **ІДЕНТИФІКАЦІЯ**

Цибулини сферичної форми, зазвичай завширшки від 3 см до 5 см; плоска основа несе на собі залишки численних коротких сірувато-коричневих додаткових коренів. Цибулина складається з приблизно 10 дочірніх цибулин (зубків), розташованих по колу навколо центральної осі. Okремі дочірні цибулини від 1 см до 3 см завдовжки, стиснуті з боків і опуклі на спинній стороні. Кожна дочірня цибулина має жорстку білу або червонувату шкірку навколо її м'ясистий трубчастий лист більш-менш округло-подовженої форми, в який вкладений конус листкових зачатків і вегетативної верхівки.

#### **ВИПРОБУВАННЯ**

**Вода (2.2.13).** Не менше 55.0 %, визначення проводять із 10.0 г дрібнорізаної сировини для демонстрації її свіжості.

#### **Матрична настойка**

Матрична настойка має відповідати вимогам загальної монографії «*Матричні настоїки для гомеопатичних препаратів*».

#### **ВИРОБНИЦТВО**

Матричну настойку *Allium sativum* L. одержують макерациєю різаної сировини з використанням етанолу відповідної концентрації.