
МЕТОДИ ПРИГОТУВАННЯ ГОМЕОПАТИЧНИХ БАЗИСНИХ ПРЕПАРАТІВ І ПОТЕНЦІЮВАННЯ

Via praeparandi stirpes homeopathicas et potentificandi

Гомеопатичні базисні препарати готують із сировини, що відповідає вимогам статті «Гомеопатичні лікарські засоби», використовуючи підхожі методи. Наведені нижче методи разом із прийнятими методами потенціювання є лише прикладами, і допускається застосування інших методів, описаних в офіційних національних фармакопеях країн-членів Ph. Eur.

Під час використання матеріалів тваринного або людського походження особливу увагу слід приділяти вимогам щодо використання сировини тваринного або людського походження, наведеним у монографії «Гомеопатичні лікарські засоби».

Під час приготування ▽водно-спиртових▲ рідких розведень зазначена в методі концентрація етанолу, якщо необхідно, може бути замінена етанолом (36 %, об/об) або етанолом (18 %, об/об).

Якщо в окремій монографії допускається приготування матричної настойки з більш ніж одного виду рослин, ▽матрична▲ настойка може бути виготовлена з окремих частин конкретних видів рослин або будь-якої їх суміші. Якщо для приготування матричної настойки має визначатися втрата в масі під час висушування, лікарська рослинна сировина або суміш лікарської рослинної сировини з етанолом має бути піддана обробці безпосередньо після визначення величини втрати в масі під час висушування.

Якщо немає інших зазначень в окремих монографіях:

— для приготування базисних препаратів термін «частина/частини» означає «масову частину/частини»;

▽
— для потенціації термін «частина/частини» означає «масову частину/частини» за винятком методів 1.1.10, 1.1.11, 2.1.3 й 3.2.3, де «частина/частини» означає «об'ємну частину/частини» або «масову частину/частини»▲.

1. МАТРИЧНІ НАСТОЙКИ ▽Й РІДКІ ПОТЕНЦІАЦІЇ▲

МЕТОД 1.1. ▽ВОДНО-СПИРТОВІ МАТРИЧНІ НАСТОЙКИ, ВИГОТОВЛЕНІ БЕЗ НАГРІВАННЯ

Якщо немає інших зазначень, матричні настойки готують методом мацерації, яка може проводитися протягом не менше 10 діб і не більше 30 діб.