

CROCUS ДЛЯ ГОМЕОПАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Croci sativi stigma ad praeparationes homoeopathicas

CROCUS FOR HOMOEOPATHIC PREPARATIONS

Висушені рильця *Crocus sativus* L., зазвичай із коротким стовпчиком.

ВЛАСТИВОСТИ

Характерний ароматний запах.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

A. Темно-цегляно-червоні рильця в сухому стані мають розмір від 20 мм до 40 мм завдовжки, після змочування водою — приблизно від 35 мм до 50 мм. Трубки поступово розширяються у верхній частині, є розріз з одного боку, верхній край відкритий і дрібнозубчастий. Стовпчик, що з'єднує 3 рильця, блідо-жовтий і не більше 5 мм завдовжки.

B. Переглядають під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату розчин *P*. На препараті виявляються діагностичні ознаки: подовжені клітини епідермісу, часто з коротким центральним сосочком; у воді клітини виділяють жовту барвну речовину; рильця на верхівці мають пальцеподібні сосочки до 150 мкм завдовжки; між ними поодинокі қулясті пилкові зерна приблизно 100 мкм у діаметрі, з тонкопористою екзиною; судинні пучки з дрібними, спірально потовщеними судинами без волокон.

C. Шматочки рослинного препарату ретельно подрібнюють до крупних частинок і змочують 0.2 мл розчину фосфорно-молібденової кислоти *P*. Частинки синіють протягом 1-2 хв або мають синє забарвлення навколо.

D. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.1 г сировини обережно подрібнюють скляною паличкою та змочують 0.2 мл води *P*. Через 3 хв додають 5 мл метанолу *P*, відстоюють 20 хв у захищенному від світла місці й фільтрують крізь скловату.