

ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ ТРАВИ ВІДЖАТИЙ СІК, СТАБІЛІЗОВАНИЙ З ЕТАНОЛОМ

*Echinaceae purpureae herbae succus
expressus et ethanolo confirmatus*

*PURPLE CONEFLOWER HERB EXPRESSED JUICE,
STABILISED WITH ETHANOL*

Віджати́й сік, стабілізований з етанолом (96 %), виготовлений зі свіжих квітучих надземних частин культивованої *Echinacea purpurea* (L.) Moench.

Вміст: не менше 0.1 мг / 100 мл *N*-ізобутилдодекатетраенаміду (C₁₆H₂₅NO; *М.м.* 247.4).

ВИРОБНИЦТВО

Сік отримують зі свіжої лікарської сировини. Свіжа лікарська сировина має відповідати таким вимогам.

Ідентифікація. Трав'яниста багаторічна рослина 60—150 см, зрідка до 180 см заввишки. Стебло червонувато-зелене, прямостояче й слабогалузисте. Листки чергові, від овальної до овально-ланцетної форми, з нерівнопильчастим краєм, зморшкуваті на обох поверхнях, темно-зелені, з виступаючими світло-зеленими жилками на нижній поверхні; пластинка товста й блискуча. Приквітки обгортки великого кошика розташовані у 2 або 3 ряди. Квітколоже тверде й дещо опукле. Крайові квітки несправжньо-язичкові, фіолетового кольору, 4—6 см завдовжки; серединні квітки трубчасті, фіолетово-рожевого кольору, оточені червонуватим загостреним і шкірястим приквітком, що перевищує за довжиною трубчасті квітки. Зрослолиста редукована чашечка з 5 короткими, різними за розміром лопатями, одна з яких до 1 мм завдовжки. Насіння з чубиком, зазвичай чотиригранне, зеленого або світло-коричневого кольору.

Сторонні домішки. Не більше 5 %.

Зі свіжої рослинної сировини віджимають сік у найкоротші терміни, але не пізніше ніж через 24 год після збирання. Зібрану рослинну сировину, яка пролежала кілька годин, ретельно перевіряють, і будь-який матеріал, який змінив колір або текстуру внаслідок ферментації/компосту, відбраковують перед віджиманням соку. Віджати́й сік стабілізують відповідною кількістю етанолу (96 %).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Мутна рідина зеленувато-коричневого кольору.