

РОЗТОРОПШІ ЕКСТРАКТ СУХИЙ, РАФІНОВАНИЙ ТА СТАНДАРТИЗОВАНИЙ

Silybi mariani extractum siccum
raffinatum et normatum

MILK THISTLE DRY EXTRACT, REFINED AND STANDARDISED

Екстракт сухий, рафінований та стандартизований, одержаний із сировини, описаної в монографії «Розторопші плоди».

Вміст: від 90 % до 110 % від зазначеного номінального вмісту силімарину, у перерахунку на силібінін ($C_{25}H_{22}O_{10}$; *М.м.* 482.4). Номінальний вміст силімарину — в межах від 30 % (*m/m*) до 65 % (*m/m*), у перерахунку на безводний екстракт.

Вміст силімарину відповідає:

- сумі вмісту силікристину й силідіаніну (обидва $C_{25}H_{22}O_{10}$; *М.м.* 482.4): від 20 % до 45 %, у перерахунку на сумарний силімарин;
- сумі вмісту силібініну A й силібініну B (обидва $C_{25}H_{22}O_{10}$; *М.м.* 482.4): від 40 % до 65 %, у перерахунку на сумарний силімарин;
- сумі вмісту ізосилібініну A й ізосилібініну B (обидва $C_{25}H_{22}O_{10}$; *М.м.* 482.4): від 10 % до 20 %, у перерахунку на сумарний силімарин.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виготовляють із лікарської рослинної сировини підхожим методом, використовуючи один або більше зазначених розчинників:

- етилацетат;
- ацетон або суміш ацетону й води;
- етанол або суміш етанолу й води;
- метанол або суміш метанолу й води.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Аморфний порошок жовтаво-коричневого кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.250 г випробовуваного екстракту розчиняють у 5 мл метанолу *P*.

Розчин порівняння. 2 мг силібініну *P*, 5 мг таксифоліну *P* розчиняють у 10 мл метанолу *P*.