

STRAMONIUM ДЛЯ ГОМЕОПАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

*Datura stramonium ad praeparationes
homoeopathicas*

STRAMONIUM FOR HOMOEOPATHIC PREPARATIONS

Свіжі надземні частини *Datura stramonium* L., зібрані в період цвітіння.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Квіти спочатку мають приємний солодкуватий запах, який, як і запах усієї рослини після подрібнення, пізніше стає неприємним і схожим на мускус. У сировині можуть бути присутні незрілі плоди.

Стебло пряме, зазвичай розгалужене, іноді нерозгалужене, 0.3–1.2 м заввишки, дуже рідко вище, недерев'янисте, порожнисте, гладке, майже циліндричне біля основи, вище має притуплену трикутну форму на поперечному зрізі й зелений або фіолетовий відтінок поверхні. Листки до 200 мм завдовжки, 150 мм завширшки, від овальної до еліптичної форми, з довгим черешком, крупнозубчастим краєм, гострою верхівкою і серцеподібною або клиноподібною основою, верхня поверхня темно-зелена і нижня — дещо світліша. Молоді листки мають пухнасті волоски, більш старі листки мають волоски вздовж зелених або фіолетових жилок. Черешок майже округлий, жолобчастий на верхній поверхні.

Прямостоячі квітки мають квітконіжку і ростуть поодинокі в пазухах, де розгалужується стебло, або на кінці бічних осей. Світло-зелена трубчаста чашечка п'ятигранна, злегка роздута, п'ятизубчаста, до 45 мм завдовжки. Після цвітіння вона опадає, залишаючи лише розширену круглу основу із заверненим до низу краєм. Віночок від білого до жовтуватого-білого або світло-фіолетового кольору, іноді зеленуватого біля основи, до 110 мм завдовжки, воронкоподібною форми з п'ятьма згорнутими, розширеними, загостреними лопатями. П'ять тичинок однакові за довжиною і коротші за віночок; нижня частина тичинок зрощена з віночком біля їх основи. Пильники, що розкриваються вздовж, прикріплені основою до нитки. Зав'язь яйцеподібна, прямостояча, з м'якими короткими шипами до 15 мм завдовжки або без них. Довгий ниткоподібний стовпчик стає дещо товстішим до вершини й має дволопатеve рильце.

ВИПРОБУВАННЯ