

HYDRASTIS CANADENSIS ДЛЯ ГОМЕОПАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Hydrastis canadensis ad praeparationes homoeopathicas

HYDRASTIS CANADENSIS FOR HOMOEOPATHIC PREPARATIONS

Сировина має відповідати вимогам монографії «Гідрастису канадського кореневища».

Матрична настойка

Матрична настойка має відповідати вимогам загальної монографії «Матричні настойки для гомеопатичних препаратів».

Матричну настойку одержують із цілих або різаних висушених кореневищ і коренів *Hydrastis canadensis* L.

Вміст:

- гідрастин ($C_{21}H_{21}NO_6$; *М.м* 383.4): від 0.10 % до 0.40 % ;
- берберин ($C_{20}H_{18}NO_4$; *М.м* 336.4): від 0.20 % до 0.50 %.

ВИРОБНИЦТВО

Матричну настойку виготовляють підходящими методами, як зазначено у загальній монографії «Методи приготування гомеопатичних базисних препаратів і потенціювання»:

- метод 1.1.8, використовують здрібнену на порошок сировину (710) (2.9.12) та етанол (70%, об/об) або етанол (62%, м/м);
- метод 1.1.10, використовують фрагментовану сировину (шматочки приблизно 1 см у діаметрі), етанол (65 %, об/об) і час мацерації від 3 до 5 тижнів.