

HYPERICUM ДЛЯ ГОМЕОПАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicas

HYPERICUM FOR HOMOEOPATHIC PREPARATIONS

Ціла свіжа рослина *Hypericum perforatum* L., зібрана на початку періоду цвітіння.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Багаторічна рослина має веретеноподібний корінь і розгалужене кореневище. Циліндричне, прямостояче стебло здерев'яніле біля основи, від 0,2 м до 1 м завдовжки, у верхній частині розгалужене, з 2 опуклими поздовжніми лініями на поверхні. Листки супротивні, сидячі, без прилистків, видовжено-ovalльні, від 15 до 30 мм завдовжки. На краях листка чорні залозисті крапки і на всій поверхні багато маленьких напівпрозорих олійних залоз, видимих в прохідному свіtlі. Квітки правильні, утворюють щиткоподібні китиці на верхівках стебла. Квітки мають 5 зелених ланцетних чашолистків із загостреними верхівками та чорними олійними вмістищами вздовж всього краю; 5 оранжево-жовтих пелюсток, значно довших за чашолистки, з чорними олійними вмістищами лише біля кінцевих країв; 3 тичинкові пластини, кожна з яких розділена на безліч оранжево-жовтих тичинок і 3 маточки з червоними приймочками. Кожна пелюстка має асиметричну лінійно-яйцевидну форму, один край цілокраїний, а інший — зубчастий.

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2): Не більше 4 % плодів і не більше 1 % інших сторонніх домішок.

Втрата в масі під час висушування (2.2.32) Не менше 55 %. Визначення проводять для демонстрації свіжості. 5.0 г різаної сировини сушать за температури 105 °C.